

Dr Maxime Champagne , DMD

Consentement libre et éclairé

Risques associés à la conservation des dents de sagesse mal positionnées.

1. Infection par la crevasse (péricoronarite) de la gencive à l'arrière de la dernière dent visible.
2. Kyste, à cause de la persistance du sac de formation de la dent, pouvant affaiblir la mâchoire.
3. Fonte de la racine (résorption) de la dent fonctionnelle contre laquelle la dent incluse s'appuie.
4. Certaines études prétendent que la poussée de dents de sagesse pourrait modifier l'alignement dentaire.

Risques associés à l'extraction des dents de sagesse mal positionnées.

1. Perte de sensation (paresthésie) d'une portion de la lèvre inférieure ou du 1/3 antérieur de la langue ou de la joue, de façon temporaire jusqu'à permanence.
2. Infection, enflure, douleur et apparition de bleus sur les joues.
3. Perte de caillot prématuré (alvéolite).
4. Saignement, douleur.
5. Dommages à d'autres dents ou structures anatomiques.
6. Spasmes et/ou douleurs musculaires, difficulté à ouvrir complètement la bouche durant quelques jours
7. Défaut osseux en arrière de la dent précédant la dent de sagesse (l'os peut ne pas se reformer)

Advenant paresthésie : suivi régulier et référence à neurologue avec anti-inflammatoire.

Advenant infection : prescription d'antibiotiques et suivi.

Advenant perte de caillot : mise en place de caillot artificiel et suivi.

J'ai lu et compris les informations ci-haut et j'ai posé toutes les questions et **ai obtenu réponse de mon dentiste.**

Signature patient :

Date